

Die Diphtherieerkrankungen an der
Erlanger Kinderklinik in den Jahren
1925 — 1934.



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von
Rupert Kufer
aus Hauzenberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 31. Dezember 1935.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1936

Referent u. Dekan: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Fr. Jamin.

In den Jahren 1925—1934 wurden an der Erlanger Kinderklinik 106 Kinder wegen Diphtherie behandelt.

Die gesamten Fälle lassen sich in 3 Gruppen einteilen:

1. lokalisierte Diphtheriefälle mit geringer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens und geringer Tendenz zur Ausbreitung der Membranen,
2. progrediente Diphtheriefälle mit starker Tendenz der Ausbreitung, vor allem mit Übergreifen auf den Larynx, mit bereits vorhandenen, wenn auch geringen Intoxikationserscheinungen,
3. eigentlich toxische Diphtheriefälle m. Giftwirkung vor allem auf Herz, Nervensystem und Nieren.

Von den 106 Fällen gehören 57 zur 1., 28 zur 2. und 21 zur 3. Gruppe.

Eine scharfe Trennung zwischen den einzelnen Gruppen ist nicht möglich, es bestehen fließende Übergänge, vor allem zwischen 2 und 3. Die Toxinbildung ist oft schwer zu beurteilen aus dem lokalen Befund. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß bei schweren toxischen Fällen auch ein ausgedehnter lokaler Befund vorhanden ist. Es kommen aber Fälle vor, wo die Patienten nur geringe oder überhaupt keine lokalen und allgemeinen Beschwerden haben und wo sich dann Lähmungen in verschiedenen Muskelgebieten oder sonstige Intoxikationen einstellen. So wurde ein Patient eingeliefert, der sich nicht an eine Erkrankung erinnern konnte und bei dem sich eine Gaumensegellähmung, Parese des Armes und des Zwerchfells entwickelte.

Schwer zu entscheiden ist oft, ob es sich um leichte Di. Fälle der 1. Gruppe oder um gewöhnliche katarrhalische Erscheinungen bei Diphtheriebazillenträgern handelt. Hat man den Befund einer Angina lacunaris und findet man Di. Baz., so ist es schwer zu sagen, ob es sich um eine Ang.

lac. bei Di. Baz. Trägern oder um eine echte Di. mit dem lokalen Befund einer Ang. lac. handelt. In der Praxis wird man sich wohl immer für das letztere entscheiden. Häufiger wird es wohl vorkommen, daß eine echte Di. als Angina angesehen wird. Auch die Entscheidung zwischen Nasendi. und Nasenkatarrh bei Baz. Trägern wird oft schwer, oft unmöglich sein.

Was die Zahl der Baz. Träger anlangt, so schwanken die Angaben der einzelnen Autoren sehr stark, nach Schick (30) zwischen 2,5 und 83 %. Reineck (28) fand unter den Schulkindern 10—15 %, Hellstroem unter Soldaten 19 % (nach Behring) (3).

Zur ersten Gruppe gehören also 57 Fälle. Davon entfallen 22 auf Nasendi., 30 auf Rachendi. und 5 auf sonstige Lokalisationen.

Von den 22 an Nasendi. erkrankten Kindern standen 15 im 1.—4. Lebensjahr, davon allein 7 im 1. Jahr. Nur 4 Fälle hatten im 1. Jahr eine andere Lokalisation. — Die Temperatur bewegte sich zwischen 37° und 39,8°. In 2 Fällen lag die Temperatur zwischen 38 und 39°, in 3 über 39°. Das Allgemeinbefinden war meist wenig beeinträchtigt. In vielen Fällen handelte es sich nur um eine vermehrte, dünn-schleimige Sekretion mit Borkenbildung. In einigen Fällen fand sich eine stärkere eitrige-blutige Absonderung, die Nasenatmung war erschwert, die Naseneingänge zeigten Rötung und Geschwürbildung. — Weiße Beläge im Nasenraum wurden nur in 2 Fällen festgestellt. Gerade das Fehlen der diphtherischen Membranen erschwert die Diagnose der Nasendi. sehr.

Bezüglich der Diagnose der Nasendi. gehen die Ansichten der Autoren weit auseinander. Göppert und seine Schule betonen (nach Lande) (19), daß man eine Nasendi. nur annehmen dürfe, wenn neben Di. Bazillen auch die Di. Membranen vorhanden seien. Sonst handle es sich nur um einen katarrhalischen Schnupfen bei Di. Bazillenträgern. Finkelstein (4) sagt: „Es geht nicht an, jeden Nasenkatarrh als Di. zu bezeichnen, weil Di. Bazillen gefunden wurden. Auch

nicht jeder seröse und blutige Ausfluß beruht, wie ich entgegen anderer Auffassung annehmen möchte, auf Di. — Die meisten Autoren betonen, daß jede sanguinolente, erodierende Sekretion aus der Nase als verdächtig auf Di. zu betrachten ist, besonders wenn die Nasenatmung erschwert ist.

Nach Schoedel (31) sind Neugeborene und Säuglinge in hohem Maße Träger von Di. Bazillen. An der Straßburger Hebammenschule fanden sich 25 %, an der Freiburger Frauenklinik 48 % Di. Bazillenträger. Die Einimpfung findet unter der Geburt statt. Lietz (31) fand bei Schwangeren im Scheidenausstrich in 20 % Di. Bazillen.

Antitoxinbestimmungen von Groer und Kassowitz (4) ergaben, daß Übereinstimmung herrscht zwischen dem Antitoxingehalt von Mutter und Kind. Das Antitoxin wird auf das Kind durch das Blut und später durch die Milch übertragen. Bei 84 % konnten sie Antitoxin im Blut nachweisen.

Die 7 Nasendi. Fälle, die bei den Säuglingen beobachtet wurden, sind alle sehr leicht verlaufen. Temperatur nicht über 37,5; keine Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, meist seröse, manchmal ganz geringe eitrige und blutige Absonderung, keine Membranbildung. Man geht wohl nicht fehl, wenn man bei der hohen Zahl von Baz. Trägern im Säuglingsalter annimmt, daß es sich in den meisten Fällen nur um einen harmlosen Katarrh bei Di. Bazillenträgern gehandelt hat. Differentialdiagnostisch kommt bei blutiger Absonderung vor allem Lues in Frage.

Von einem schwer toxischen Fall von Nasendi. im Säuglingsalter wird später die Rede sein.

Auch bei den übrigen Fällen wird es sich bei geringen Erscheinungen von seiten der Nase manchmal nur um einen gewöhnlichen Katarrh gehandelt haben, wenn auch nicht mehr so häufig wie im Säuglingsalter, zumal die natürliche Immunität in den meisten Fällen nach dem 1. Jahr verloren geht.

Eine scharfe und sichere Trennung zwischen diphtherischer Nasenentzündung und dem Katarrh von Baz. Trägern wird in vielen Fällen äußerst schwierig, oft unmöglich sein.

Gerade dieser unscheinbare und harmlose Verlauf unter dem Bild eines gewöhnlichen Katarrhs ist oft schuld, daß die Di. nicht erkannt wird. Schließlich stellt sich dann ein schweres toxisches Krankheitsbild ein. Dies gilt ganz besonders für einen Säugling, dem die natürliche Immunität fehlt. Eine weitere Gefahr ist die Übertragung von Bazillen auf andere. Es ist deshalb dringend geboten, besonders im Säuglingsalter, bei Nasenkatarrh mit Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens und Bazillen-Befund Di. Serum zu geben.

Was die Therapie anlangt, so wurden in 12 Fällen Serummengen von 1000—10 000 E. gespritzt, meist zu gleicher Zeit auch ein Serumtampon eingelegt, in ganz leichten Fällen nur das letztere.

Bei den 30 Fällen mit Rachendiphtherie waren fast immer beide Tonsillen mit grau-weißen, festhaftenden Belägen bedeckt, in 1 Fall nur die Uvula. In einigen Fällen waren bei Einlieferung die Beläge schon fast völlig verschwunden. Die Temperatur bewegte sich zwischen 37 und 40,9. Bei 10 Fällen war die Temperatur über 39. Dem Alter nach waren 13 zwischen 0—6, 17 über 6 Jahre. Im 1. Jahr war nur 1 Kind an Rachendi. erkrankt. Zu gleicher Zeit bestand noch Keuchhusten. Die Tonsillen waren nur gerötet. Wahrscheinlich handelt es sich hier nur um einen Katarrh bei Bazillen-Träger, sonst hätte sich wohl bei dem bestehenden Keuchhusten die Di. deutlicher bemerkbar gemacht. Der Grund, warum Säuglinge viel seltener an Rachendi. erkranken, kann in der mangelhaften Entwicklung der Tonsillen gelegen sein, wahrscheinlicher ist, wie ich glaube, daß gewöhnliche katarrhalische Erscheinungen und Bazillen-Befund, die bei der Nase als Di. angesprochen werden, hier viel seltener erkannt und bemerkt werden. Geringe Lymphdrüsenanschwellung bestand in fast allen Fällen von Rachendi. ohne Druckschmerzhaftigkeit, in einigen Fällen febrile Albuminurie. Die Patienten kamen meist schon am 2. und 3. Tag in Behandlung, die in Seruminjektionen von 3000—11 500 E. bestand, Gurgeln mit H_2O_2 , $KMnO_4$, Ortizon, Pinseln mit Trypaflavin,

Sonstige Lokalisationen der Di. waren:

- 1 Fall von Augendi. ohne Übergreifen auf die übrigen Schleimhäute, Verlegung in die Augenklirik,
- 1 isolierte Lippendi., Ober- und Unterlippe mit Di. Membranen belegt,
- 1 Vulvadi. mit lebhafter Rötung und grau-weißen Belägen,
- 2 Fälle mit Hautdi. bei Erythrodermia desquamativa bzw. Ekzem.

In 2 weiteren Fällen fand sich neben der Hautdi. eine Beteiligung von Nase und Rachen. Man darf wohl annehmen, daß in diesen Fällen Di. Bazillen auf die offenen Stellen der Haut durch Schmierinfektion übertragen wurden.

Die Allgemeinerscheinungen waren gering, in 1 Fall Temperatur 39,4. Seruminjektionen von 4—8000 E. bzw. Serumkompressen.

Von den 28 Fällen der zweiten Gruppe hatten 4 ausgebreitete Beläge ohne Übergreifen auf den Larynx, in 24 Fällen war der Larynx ergriffen.

In den vier Fällen nun kam es zur Beteiligung von Gaumenbögen, Uvula, Rachenwand und Nase, zu starker Rötung und Schwellung des ganzen Rachenraumes. Infolge des starken Ergriffenseins von Nasen- und Rachenraum kam es zur Erschwerung der Atmung, teilweise zu den Erscheinungen des pharyngealen Stridors. Temperatur zwischen 38—40°, stärkere Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, schon Intoxikationsymptome (kleiner, stark beschleunigter, weicher Puls), Albuminurie. Serum-mengen von 6—13000, Lokalbehandlung besonders mit Dampf.

Bei den Larynxstenosen waren in etwa der Hälfte der Fälle noch Beläge im Rachen, besonders an den Tonsillen, zu sehen. In einem Fall fand sich eine ausgedehnte Zungen- und Tonsillendiphtherie. Bei den übrigen bestand meist noch Rötung und Schwellung der Tonsillen.

Nach Baginsky (2) sind primäre Larynxerkrankungen sehr selten, andere lehnen sie überhaupt ab. Die Rachen-erscheinungen können aber doch wohl so gering sein, daß

sie nicht bemerkt werden und erst die Erschwerung der Atmung auf die Krankheit aufmerksam macht.

Unter den Larynxstenosen ist ein Fall besonders bemerkenswert, bei dem keinerlei Erkrankung der Nase oder des Rachens bestand. Es handelte sich also anscheinend um eine primäre Erkrankung des Kehlkopfes. Es bestand tonlose, heisere Sprache und bellender Husten. Die Temperatur betrug 39°. Allmählich stellte sich bedrohliche Atemnot ein. Plötzlich trat ein heftiger Erstickungsanfall auf. Unter heftigem Husten wurde ein fibrinöses, röhrenförmiges Gebilde ausgehustet, das einen vollkommenen Ausguß der Trachea und der Bronchien darstellte. Darauf trat rasche Besserung der Atmung ein. Am nächsten Tag wurde nochmals ein Membranstück ausgehustet. Für eine Bronchitis fibrinosa im Sinne einer Sekretionsneurose fand sich kein Anhaltspunkt. Im Blut fanden sich die Eosinophilen nicht vermehrt, im Gegenteil, sie fehlten vollständig. Außerdem bestand eine Leukocytose von 27 300 und eine Lymphopenie von 9,4 %. Auf den Membranen wurden *Di. Baz.* gefunden, aber nicht im Rachen. Sonst bestanden keinerlei schwerere Erscheinungen.— Vielleicht muß man aber in diesem Fall doch eine gewisse Bereitschaft des Organismus zur Fibrinbildung im Sinne einer Sekretionsneurose annehmen.

14 von den Erkrankten waren 0—5, die übrigen 5—10 Jahre alt. Eine besonders starke Beteiligung eines Lebensalters konnte nicht festgestellt werden. Auf die Gesamtzahl der *Di.* Fälle berechnet betrug die Larynxd. 22,5%.

Die Temperatur lag meist zwischen 38—40, in 2 Fällen, die ad exitum kamen, unter 37. Cyanose, sägender Stridor war meist ziemlich ausgesprochen, ebenso inspiratorische Einziehungen, tonlose Stimme und Unruhe. Im Urin fand sich in etwa der Hälfte der Fälle Eiweiß in verschiedener Menge, in 1 Fall bis 5 ‰. Daneben auch noch manchmal vereinzelt Zylinder und Erythrozyten. Der Puls war in den meisten Fällen stark beschleunigt, in einigen auffällig klein und weich. Neben einer gewissen Intoxikation spielt dabei wohl die Überanstrengung des Herzens durch die

dauernde ungewöhnlich starke Atemtätigkeit und die mangelhafte O₂-Versorgung eine Rolle.

Stettner (35) hat darauf hingewiesen, daß besonders der pyknische Habitus bei den Stenosen bevorzugt sei und sprach deshalb von Stenosenhabitus. Soweit Angaben vorhanden sind, war er in 11 Fällen ziemlich ausgesprochen.

Nach Baginsky kann auch eine rein katarrhalische Schwellung der Larynxschleimhaut stenotische Erscheinungen, wenn auch nicht so bedrohlicher Art, machen. Es können Heiserkeit, rauher, heiserer Husten und leichte inspiratorische Einziehungen vorhanden sein.

Dehio (4) weist auf Grund seiner laryngoskopischen Untersuchungen darauf hin, daß die engste Stelle nicht in der Höhe der Glottis, sondern tiefer liegt. Durch das Auftreten dieser hypoglottischen Wülste wird der Husten bellend und die Atmung stridorös. Hier bestehen oft nur geringe oder gar keine Beläge. Erst im Laufe der nächsten Stunden und Tage tritt dann das fibrinöse Exsudat immer deutlicher in Erscheinung. Auch Bokay und Rauchfuß (37) schreiben dieser subglottischen Quellung eine große Bedeutung zu. — Dorbrandt und Karger (nach Bokay) (4) weisen darauf hin, daß jede Stenose 2 verschiedene Komponenten zeige, die eine sei die mechanisch-anatomische, die andere die neurogen spastische. Ist die Atmung durch mechanische Verengerung des Lumens behindert, so wird das Kind unruhig, durch die Unruhe wird noch mehr die Atmung beansprucht. Unter der geschwollenen Schleimhaut treten Spasmen auf, die die ohnehin schon enge Öffnung noch mehr einengen. Szontagh (37) weist besonders auf die psychische Komponente bei Stenosen hin.

Wenn wir unsere Fälle unter diesen Gesichtspunkten betrachten, so kommen wir zu dem Schluß, daß diese Faktoren in vielen Fällen eine große Rolle gespielt haben. Die Larynxstenosen wurden neben dem Serum (4–20000, je nach Schwere des Falles) vor allem mit Sauerstoff-Adrenalininhalationen behandelt und mit Dampf. Ferner wurden auch Beruhigungs- und Schlafmittel gegeben. In einigen Fällen wurde in ganz kurzer Zeit ein deutliches Nach-

lassen des Stridors, der Cyanose und der Einziehungen festgestellt. Auch Erstickungsanfälle konnten manchmal in überraschend kurzer Zeit beseitigt werden. Es besteht wohl kein Zweifel, daß dies zum großen Teil auf das Nachlassen der Schwellung, auf die Beruhigung und ev. auf die Lösung von Spasmen zurückzuführen ist. Die intensive Serumtherapie verhinderte die Bildung von Membranen bzw. förderte die Einschmelzung der schon vorhandenen.

Mit dieser Therapie wurde nur in fünf Fällen von Larynxdi., also nur in 20%, eine Tracheotomie notwendig. Mit 2 Ausnahmen wurden alle Fälle ohne Tracheotomie zwischen dem 1. bis 4. Krankheitstag eingeliefert. Von den übrigen je 2 am 5. und 6., 1 am 4. Tag. Sie wurden auswärts nicht behandelt bzw. gleich eingeliefert. Bemerkenswert ist, daß seit 1929 keine Tracheotomie mehr gemacht wurde, obwohl 15 Larynxdi. Fälle eingeliefert wurden.

Indikationen zur Tracheotomie waren: Starkes Nachlassen der Herztätigkeit trotz Gabe von Cardiacs, Übergang der motorischen Unruhe in Muskelerstarrung, Auftreten von Benommenheit und Bewußtseinsverlust, Nichterholen nach einem Erstickungsanfall. In allen Fällen wurde die Tracheotomia inf. gemacht. — Über die Indikation zur Operation herrschen unter den Autoren große Meinungsverschiedenheiten. Nach Baginsky ist Anlaß zur Operation, wenn langgedehntes inspiratorisches und wahrnehmbares expiratorisches Atmen vorhanden ist, Erstickungsanfälle selbst schon minderen Grades mit Angstgefühlen und Jaktation. — Schloßmann (23) ist der Ansicht, daß im allgemeinen ein operativer Eingriff nicht erforderlich sei. Man komme über die kritische Zeit, bis das in reichlicher Dosierung einverleibte Serum wirkt, am besten hinweg durch Verabreichung von Beruhigungs- und Schlafmitteln, durch frische Luft und Vermeidung jeder Aufregung. — Bessau (23) spricht von 54 %, Bokay von 47 %, Schloßmann von 28 % Operationen.

In 2 Fällen wurde die Operation gleich bei der Einlieferung, in 3 am 2. Tag gemacht. Infolge der starken

CO₂-Vergiftung war Narkose entweder überhaupt nicht oder nur in geringen Mengen notwendig. Nach der Tracheotomie trat sehr rasch ein Umschwung ein. Zuerst einige tiefe Atemzüge, dann Aussetzen der Atmung infolge Sauerstoffüberladung des Blutes und Verminderung des CO₂-Reizes auf das Atmungszentrum. Es setzten Reizhustenfälle ein mit Entleerung von Schleim und Eiter. In 1 Fall entleerten sich zahlreiche fibrinöse Lamellen und ganze Ausgüsse aus der Trachea. Die Entfernung der Kanüle wurde am 4. 6. Tag vorgenommen. Wundheilung trat in allen Fällen sehr rasch ein. Man müßte doch eigentlich annehmen, daß es hier leicht zur Ausbildung einer Wunddi. käme. Wahrscheinlich dauert es doch einige Zeit, bis der Bazillus sich dem neuen Nährboden angepaßt hat und bis dahin sind die lokalen und humoralen Abwehrkräfte so stark durch die Serumbehandlung ausgebildet, daß er keine Giftwirkung mehr entfalten kann. Außerdem muß man berücksichtigen, daß die bereits toxisch schwer geschädigten Kranken bald nach der Tracheotomie zugrunde gehen und sich daher keine Hautdi. mehr ausbilden kann.

Auffällig war in 3 Tracheotomiefällen der sehr hohe Temperaturanstieg nach der Oper. Die Kinder wurden mit 37—37,5 eingeliefert, nach der Oper. hatten sie 40; 40,7; 41,7. Baginsky schreibt, daß ein rapider Temperaturanstieg ominös sei. Das Kind mit 41,7 kam ad exitum. Stettner (35) glaubt, daß es durch Zerrung und Quetschung der Schilddrüse zu einem vermehrten Übertritt von Sekret ins Blut komme und dadurch zu Temperatur-Erhöhung. Bei jungen Kindern bestehe an sich eine erhöhte Temperatur-Labilität und Neigung zu Hyperthermie und das umso mehr, je geringer die Wasseraufnahme sei. Die Wasseraufnahme sei nach dem Luftröhrenschnitt besonders vorsichtig und zurückhaltend. Diese Frage bedarf aber noch der weiteren Aufklärung.

Im ganzen starben 3 Fälle von Larynxdi., die Letalität betrug also 12,5%. Bei 1 Pat. handelte es sich um einen descendierenden Krupp, Tracheotomie wurde, da aussichtslos, nicht gemacht. Die Differentialdiagnose zwischen

Larynx- und descendierendem Krupp ist oft schwer, im Zweifelsfall muß eben immer die Oper. gemacht werden.

Bei dem descendierenden Krupp handelte es sich um ein Kind von 1½ Jahren, das vor wenigen Tagen Masern hatte und dann anschließend an Di. erkrankt war. Am 2. neuen Krankheitstag wurde es vom Hausarzt mit 4000 E. Serum behandelt, am 3. Tag in der Klinik mit 14000 E. Die Temperatur betrug 36,8. Unter hochgradiger Atemnot mit Rasseln in der Tiefe trat in wenigen Stunden der Tod durch Erstickten ein. Kurz vor dem Tod traten Streckkrämpfe an den Extremitäten und Zuckungen um den Mund auf. Klonische Krämpfe wurden auch in einem anderen Fall vor der Tracheotomie beobachtet. Die Krämpfe sind wohl als Erstickungskrämpfe bei CO₂-Vergiftung aufzufassen. — Nach Masern zeigt die Di. die Tendenz zu sehr rascher Ausbreitung und Descension in die feinen Bronchien. Die Masern bedingen eine schwere Schädigung der Schleimhäute des Respirationstraktus und es kommt deshalb infolge Mangels der lokalen Abwehr zum raschen Fortschreiten.

Von den Tracheotomierten sind 2 gestorben. In dem 1. Fall entleerten sich bei der Tracheotomie grünlich-gelbe, dünnflüssige Eitermassen, aber keine Membranen. Der Tod trat nach einigen schnappenden Atemzügen in wenigen Minuten ein. Die Sektion ergab Kehlkopfdi., eitrige Bronchitis und konfluierende Bronchopneumonie in allen Lappen.

Bronchopneumonische Herde kommen bei der Di., besonders bei Larynxdi., ziemlich häufig vor. Baginsky nennt die Bronchopneumonie die häufigste und verderblichste Komplikation der diphtherischen Halsaffektion und fand sie in 30% der Sektionsfälle. Friedländer fand sie nach Baginsky unter 94 Sektionen 80 mal. Nach Baginsky kann der Di. Baz. allein eine Bronchopneumonie hervorrufen, im allgemeinen wird es sich aber um eine Mischinfektion handeln. — Bei einem 2. Tracheotomiefall erfolgte der Tod am folgenden Tag unter den Zeichen der Herzschwäche.

Schon in der zweiten Gruppe kam eine gewisse Toxinwirkung zum Ausdruck, die sich durch das Auftreten

von Albuminurie, ev. durch Beimengung von anderen morphologischen Bestandteilen, durch einen kleinen, weichen und beschleunigten Puls äußerte. In der dritten Gruppe nun fasse ich ohne Rücksicht auf den örtlichen Befund alle Fälle zusammen, bei denen die Toxinwirkung besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Sie umfaßt also Di. Fälle, die nur ganz geringen örtlichen Befund aufweisen, und solche, die mit schweren lokalen Erscheinungen einhergehen, die auch als *Diphtheria gravissima*, *maligna*, *septica*, *hypertoxica* bezeichnet werden. Man bezeichnet damit im allgemeinen Di. Fälle, bei denen sich neben schwerem Allgemeinbefund im Rachen ausgedehnte bräunlich-schmierige Beläge mit *Ulcera* und gangränösem Zerfall finden. Wenn aber eine Di. mit geringeren örtlichen Erscheinungen und weißen Belägen in wenigen Tagen zum Tode führt in der gleichen Weise wie eine mit schwerem Befund, so kann man wohl auch bei ihr von *hypertoxica* und *maligna* sprechen. Der Kernpunkt ist schließlich nicht der örtliche Befund, der auch bei sonstigen lokalen Erkrankungen schwer sein kann, sondern ausschlaggebend ist die Wirkung auf den allgemeinen Organismus. Ja man kann doch eigentlich sagen, daß gerade jene besonders maligne und hypertoxisch sind, die fast gar keinen lokalen Befund aufweisen, weil eben die Widerstandskraft so gering bzw. die Toxinwirkung so stark ist, daß sofort der gesamte Organismus mit ungeheuren Toxinmengen überschwemmt wird.

Am harmlosesten nun ist noch die Giftwirkung auf die Niere. In 9 Fällen wurde eine stärkere Nierenbeteiligung festgestellt. Davon waren 4 mit schwerer Herzschädigung und 3 mit Lähmungen kombiniert. In 2 Fällen bestand eine isolierte schwere Nierenschädigung. Eiweiß, hyaline und granulierte Zyl. wurden in verschieden großer Menge gefunden, außerdem in 5 Fällen zahlreiche Erythrocyten. Die 4 Fälle ohne Erythr. sind zweifellos als degenerative Erscheinungen im Sinne einer Nephrose aufzufassen. Ob die übrigen alle als Glomerulonephritiden, hervorgerufen durch das Di. Toxin, aufzufassen sind, ist schwer zu entscheiden. In 1 Fall, bei dem spärlicher Urin,

hoher Eiweißgehalt, massenhaft Erythr. und granulierte Zyl. vorhanden waren, außerdem Ödeme und urämische Erscheinungen bestanden, besteht der dringende Verdacht eines rudimentären Scharlach. Bei den übrigen Fällen bestanden keine solchen Erscheinungen.

Die Angaben in der Literatur über die Nierenschädigung sind nicht einheitlich. Hottinger (11) fand in allen Fällen mit maligner Di. eine akute hämorrh. Nephritis. Königsberger spricht von der Nephrose als konstantem Befund. Schick sagt, daß Blutbeimengungen wohl auf Niereninfarkte zurückzuführen seien, sonst spricht er nur von Nephrosen. Bokay bezeichnet die Nephrose als Zeichen einer schweren allgemeinen Intoxikation. — Sicher spielt in einigen Fällen ein rudimentärer Scharlach eine Rolle, vielleicht ist bei den schweren toxischen Fällen auch eine hämorrhagische Diathese im Spiel.

Die Nierenerscheinungen zogen sich, soweit die Pat. nicht wegen anderer Komplikationen ad exitum kamen, oft wochenlang unter langsamer Besserung hin und in einigen Fällen bestand auch noch bei Entlassung ein pos. Nierenbefund. Albuminurie überhaupt fand sich in fast 40% aller Di. Fälle, schwere Nierenschädigung in 8,5%.

Schon verhängnisvoller als die Nierenschädigungen waren die diphtherischen Lähmungen die in 7 von den 21 Fällen der dritten Gruppe zu verzeichnen waren. In 2 Fällen trat die Lähmung schon etwa 1 Woche nach Beginn der Erkrankung auf, in 4 Fällen nach 2--5 Wochen, in 1 Fall wurde eine lokale Di. Erkrankung nicht bemerkt.

Bei den 5 letzteren Fällen bestand 2mal eine isolierte Gaumensegellähmung. In 1 davon trat nach 14 Tagen Tod an Herzschwäche ein. Im anderen fehlte außerdem noch der Achillessehnenreflex, nach 5 Wochen war noch keine Besserung festzustellen, wann und ob überhaupt Rückbildung erfolgte, ist nicht angegeben. Einmal bestand eine Gaumensegel- und Akkommodationslähmung, Heilung nach 10 Wochen; 1 mal Parese beider Beine und der Bauchmuskulatur mit Fehlen des Pat. und Achill. Refl., Heilung nach 5 Wochen;

1 mal Lähmung bezw. Parese des Armes, Zwerchfells und der mimischen Musk. der rechten Seite, des Gaumensegels, der Kopfhalt- und Rückenmusk. Reflexe der unteren Extr. waren erhalten, wenn auch abgeschwächt, Hautrefl. sehr lebhaft. Im letzten Fall hatte sich die Lähmung ganz langsam entwickelt, 14 Tage nach Beginn setzte Rückbildung bis zu völliger Heilung ein. In allen Fällen handelte es sich um eine leichte Nasen- oder Rachendi., die nur ganz geringe Erscheinungen machte. Deshalb wurde entweder überhaupt kein Serum injiziert oder erst nach Ausbruch der Lähmungen. Nur in 1 Fall wurden nach der 1. Woche 4000 E. gegeben.

Besonders schwer sind die beiden Früh lähmungen verlaufen. In dem 1 Fall handelte es sich um ein Kind von 4 Jahren, das Masern hatte und kurze Zeit darnach an Di. erkrankte. Es wurde in den 1. Krankheitstagen mit 7000 E. behandelt. Nach der 1. Woche stellte sich eine Sprachstörung und Parese beider Beine ein. Nach einiger Zeit besserte sich der Zustand, aber bald trat wieder Verschlimmerung ein. 5 Wochen nach Beginn der Erkrankung Gaumensegellähmung, von da ab dann unaufhaltbares Vorwärtsschreiten der Lähmungen: Schwäche der Bein- und Rumpfmusk., Behinderung der Augenbewegung, Fehlen der Bauchdecken-, Pat.- und Ach. Reflexe, Enuresis, schließlich doppelseitige Zwerchfellähmung. Es stellte sich Rasseln über der Trachea und der Lunge ein, bald darauf Exitus. Zuletzt war nur noch oberflächliche Atmung der linken Brustkorbhälfte vorhanden, aktive Bewegungen waren nicht mehr möglich, infolge Schlucklähmung mußte Sondenfütterung stattfinden.

Die doppelseitige Zwerchfellähmung ist der Schlußakt in dem fürchterlichen Bild der Lähmungen. Der Schleim kann nicht mehr gehoben werden, atelektatische und bronchopneumonische Herde bilden sich, die Dyspnoe nimmt immer mehr zu, schließlich erfolgt der Tod ziemlich plötzlich unter dem Bild der Erstickung.

Ebenso schwer ist ein weiterer Fall von Lähmungen verlaufen. Ein 5 jähriges Mädchen war am 8. 4. mit Hals-

schmerzen erkrankt, am 9. und 10. Di. Serum unbekannter Menge. Am 15. undeutliche nasale Sprache, sehr viel Erbrechen, Kind klagte über heftige Leibschmerzen. Am gleichen Tag Aufnahme in die Klinik. Schon tagelang bestand sehr hartnäckige Obstipation, Leib war aufgetrieben und diffus druckschmerzhaft. Nach einiger Zeit entleerte sich eine große Menge Stuhl. Der Leib wechselte in der Folgezeit seine Konfiguration oft, war bald eingesunken, bald stark vorgewölbt. Der Herzbefund verschlechterte sich: Puls sehr langsam und klein, Aktion sehr unregelmäßig. Nach dem Urinbefund bestand außerdem eine Nephrose. In den nächsten 14 Tagen trat weitgehende Besserung ein: Rückbildung der Lähmung, Besserung des Herz- und Nierenbefundes, Stuhlgang in Ordnung. Am 30. 4. wurde das Kind entlassen, um auswärts weiter behandelt zu werden. Bis 17. 5. war das Allgemeinbefinden ziemlich gut, dann setzte eine Sprachlähmung ein, die sich von Tag zu Tag verschlimmerte. Schluckbeschwerden traten auf, eine Zwerchfelllähmung wurde festgestellt. Am 23. 5. erfolgte der Tod durch Schluckpneumonie, das Herz war zuletzt vollständig in Ordnung.

In beiden Fällen ist bemerkenswert, daß die Lähmungserscheinungen frühzeitig einsetzten, dann zur Ausheilung kamen und nach einiger Zeit von neuem auftraten. Ferner ist noch in dem 1. Fall das Auftreten einer Enuresis, im anderen die Darmlähmung hervorzuheben.

Baginsky weist darauf hin, daß es bei der Di. auch zur Lähmung des vegetativen Nervensystems kommen kann. Er spricht von einer unüberwindlichen Obstipation mit Atonie des Darmkanals. Auch Acker (1) betont, daß die Di. Lähmung sich auf den Darm erstrecken kann, sodaß infolge ungenügender Peristaltik die Defäkation nicht von statten gehen kann. De Rudder (8) beschreibt einen Fall von paralytischem Ileus nach Nasendi. bei einem Säugling von 3 Monaten. 14 Tage nach Beginn der Erkrankung, als die Nasendi. so gut wie abgeheilt war, stellte sich eine hochgradige Auftreibung des Leibes ein. Bei der Operation waren die Darmschlingen hochgradig gebläht und

zeigten keine Peristaltik. Eine mechanische Behinderung war nicht zu finden. Einige Stunden später trat der Tod ein.

Was die Entstehung der Lähmungen anlangt, so nimmt man allgemein an, daß das Toxin sich auf dem Weg der Nervencheiden ausbreitet. Während man früher den primären Angriffspunkt mehr in die Peripherie verlegte, neigt man heute mehr dazu eine zentrale Lähmung des Bulbus und des Rückenmarkes anzunehmen. Der Ausbruch der Lähmung ist dann gleichsam das Zeichen der Ankunft des Giftes im Zentrum. Für eine zentrale Ursache sprechen auch die Liquorveränderungen, die man nachweisen konnte. Die Neuritis entwickelt sich dann als sekundäre Folge. Aber die Streitfrage, ob periphere oder zentrale Läsion, was primäre, was sekundäre Veränderung ist, ist immer noch nicht endgültig entschieden. Aus dem Ausbreitungsweg des Toxins ist verständlich, daß besonders die Nervengebiete betroffen sind, die in unmittelbarer Nähe des Di. Herdes sitzen, also bei Rachendi. Gaumensegel, Augenm., Gesichts- und Schluckm. Bei Lähmung der gesamten Atemm. kann man auch an eine Lähmung des Atemzentrums in der Med. obl. denken, besonders wenn der Tod ziemlich plötzlich eintritt.

Eine gewisse Affinität des Toxins zu bestimmten Nerven bzw. Nervenzentren oder eine besondere Empfänglichkeit derselben für das Toxin ist sicher vorhanden. Denn manche werden sehr selten, andere sehr häufig ergriffen. Dies gilt vielleicht auch von den Lähmungen der unteren Extremität, wenn sie bei Rachendi. eintreten und die Rücken- und Bauchm. frei ist. Die Übertragung erfolgt wohl hier durch den Liquor oder überhaupt durch das Blut. Was die Früh lähmung anlangt, so dürfte hier weniger der Nervenweg in Frage kommen, als der Blutweg, besonders wenn an eine Rachendi. sich eine Parese der Beine anschließt. — Die Früh lähmung des Gaumensegels kann durch entzündliche Infiltration bedingt sein, ausgehend von der Pseudomembran und kann nach deren Abstoßung wieder verschwinden. Manche Autoren nehmen auch eine direkte Muskelschädigung, eine diphtherische Myositis an. Im übrigen sind gerade die Fragen der diphtherischen Lähmungen noch reichlich ungeklärt.

Die schwersten Auswirkungen zeigt das Di. Toxin am Kreislauf und am Herzen. Auf die Beteiligung dieses Systems sind die meisten Todesfälle zurückzuführen. In 13 Fällen der 3. Gruppe fand sich eine schwere toxische Herz- und Kreislaufschwäche, davon sind 10 gestorben. 8 sind innerhalb der ersten 12 Tage, 2 nach 3½ bzw. 5 Wochen ad exitum gekommen. Man kann also die einen als Früh-, die anderen als Spättodesfälle bezeichnen.

Die Ursachen, die für den Eintritt des Todes angegeben werden, lassen sich in 2 Gruppen einteilen. Die eine umfaßt die Einwirkung des Di. Toxins auf den Kreislauf, die erst sekundär das Herz betrifft und vor allem bei den Frühtodesfällen in Frage kommen soll, die andere die direkte Einwirkung des Toxins auf das Herz.

Romberg und Päßler (nach Siebert) (32) nahmen bei den Todesfällen der ersten Krankheitswochen eine Vasomotorenlähmung durch Vergiftung des Zentrums in der Med. oblongata an. Die Veränderungen des Myokards entstehen erst sek. durch mangelhafte Durchströmung der Koronargefäße. — Auf das Gleiche kommt die Anschauung Munks (25) hinaus, der eine periphere Vasomotorenschädigung annimmt. Es kommt zur Atonie im Splanchnikusgebiet und in den Kapillaren. Die Ernährung aller lebenswichtigen Organe leidet, schließlich erlahmt das Herz. — Moltchanoff (24) schreibt bei den Frühtodesfällen den Nebennieren eine große Bedeutung zu. Er glaubt, daß die Nebennieren aktiv den Kampf gegen das Gift aufnehmen. Am Anfang sei deshalb gesteigerte Funktion vorhanden und damit Vergrößerung des Organs, dann aber komme es zur Erschöpfung und zur Atrophie. Damit sei auch eine starke Abnahme des Lipoidgehaltes verbunden. Die eine Funktion bestehe in der Neutralisation des Giftes und sei an den Lipoidgehalt der Rindenzellen gebunden. Die 2. Funktion äußere sich in der Bildung von Adrenalin im Mark. Zuerst komme es zu einer gesteigerten Produktion, dann aber zur Abnahme, zum Sinken des Blutdrucks und dadurch zur Erschöpfung der Herzkraft. Auf eine gesteigerte Adrenalinbereitung sei die Blutdruck-

steigerung am Anfang, der erhöhte Blutzucker und das Auftreten von Zucker im Urin zurückzuführen.

Im klinischen Bild kann man jedenfalls nicht unterscheiden, ob es sich um eine zentrale oder periphere Lähmung oder um eine Nebenniereninsuffizienz handelt. Diese Ursachen sollen vor allem bei Fröhntodesfällen in Betracht kommen, bei denen man im path.-anatomischen Bild keine oder nur ganz geringe Veränderungen des Herzens nachweisen kann.

Was nun die direkte Einwirkung des Toxins auf das Herz anlangt, so nimmt Eppinger (14) eine toxische Myolyse, eine Auflösung der Muskelfibrillen durch toxisches Ödem an. Das Herz fließt nach Schick förmlich auseinander. Die Myokarditis ist nach Eppinger eine sekundäre reaktive Erscheinung. Bei akutem Herztod findet man daher in vielen Fällen eine hyaline und fettige Degeneration der Herzmuskelfasern, Aufquellung und Verflüssigung des Sarkoplasmas, nur geringe Zellinfiltration der Interstitien. Bei langsam verlaufenden Fällen ist neben der Verfettung und dem scholligen Zerfall noch eine massenhafte interstitielle Zellinfiltration mit Lymphocyten und Plasmazellen zu sehen.

Schwere Herzschädigungen mit Kollapszuständen, die aber nicht zum Tode führten, fanden sich in 3 Fällen. Sie konnten mit Cardiacis in relativ kurzer Zeit behoben werden, allerdings hielt die Herzschwäche noch längere Zeit an. In 2 Fällen handelte es sich um eine Nasen-Rachen- bzw. Rachen-Kehlkopfdi. In einem Fall fanden sich im Rachen zahlreiche Ulcera, starke Schwellung der Unterkieferdrüsen, außerdem Fötur und eine nephrotische Nierenschädigung. Die Herzschwäche war in diesem Fall besonders stark, schon bei den geringsten Bewegungen trat Pulslosigkeit und Cyanose auf. Nur langsam trat Besserung ein. Am 5. Krankheitstag wurden 10 000 E. Serum gegeben, in den beiden anderen Fällen am 5. bzw. 10. Tag 4000 bzw. 10 000. Die Herzschwächezustände setzten am Ende der 1., anfangs der 2. Woche ein. Es erfolgte längere Zeit Behandlung mit Cardiacis.

Was nun zunächst die beiden Spättodesfälle betrifft, so bestand bei ihnen schon längere Zeit große Mattigkeit und Schwäche. Dann aber setzte ziemlich plötzlich Herzschwäche ein mit Cyanose, unregelmäßigem, fadenförmigem, sehr beschleunigten Puls. Sie starben bald nach der Einlieferung in die Klinik, mit Serum waren sie nicht behandelt worden. In beiden Fällen wurde eine deutliche Dilatation des Herzens festgestellt.

Bei dem Pat., bei dem die Di. 5 Wochen zurücklag, wurde eine Sektion vorgenommen. Man hätte nun erwarten sollen, daß hier ein deutlicher Befund einer Myokarditis bestünde. Es fand sich aber nur eine deutliche Dilatation des Herzens, der Muskel war schlaff. Mikr. waren keinerlei Zeichen von Myolyse oder Myokarditis zu sehen, nur geringe trübe Schwellung und an wenigen Stellen feintropfige Verfettung. Entweder man nimmt hier eine spät eintretende Vasomotorenlähmung an oder, was wahrscheinlicher ist ebenso wie oft bei Frühtodesfällen, eine anatomisch nicht wahrnehmbare Läsion, die die schwersten Funktionsstörungen hervorrufen kann, z. B. Reizleitungsstörungen.

Von den Frühtodesfällen verliefen 4 wie eine gewöhnliche Di. und zwar 1 als Larynx- und 3 als Rachendi. Die Krankheit dauerte 5—12 Tage. Die Herzschwäche setzte ganz plötzlich ein, nachdem die Kinder zum Teil schon wieder ganz munter waren. In 1 Fall fand sich eine auffallende Bradykardie. In 3 Fällen wurde kein Serum gegeben, in einem 6000 E. am 3. Krankheitstag. Bei der Sektion fand sich in 1 Fall ein deutlicher Lipoidmangel der Nebenniere, das Herz war schlaff und zeigte sonst keine Veränderung. Bei einem anderen Fall, bei dem der Tod am 12. Tag eintrat, fand sich ein schlaffes, dilatiertes Herz. Mikr. war eine mäßig deutliche Myolyse in Form eines kleinflockigen, hyalinscholligen Zerfalls mit Auflösung des färbbaren Myoplasmas zu sehen. Außerdem fand sich eine ziemlich diffuse interstitielle Myokarditis. Es ist hier also schon in frühen Stadien ein deutlicher Herzbefund vorhanden.

Bemerkenswert ist noch ein Fall von Nasendi. bei einem Säugling von 11 Tagen. Es bestand erschwerte Atmung, Cyanose, blutig-eitrige Sekretion aus der Nase, starke Borstenbildung. Trotz dauernder Wärme-Zufuhr kam es zum Absinken der Temp. auf 32°. Der Puls betrug 75. Unter geringem Ansteigen der Temp. trat der Tod ein. Es kann sich hier um einen schweren Fall von Di. Intoxikation handeln, bei dem besonders die Temp. herabsetzende Wirkung des Toxins deutlich zum Ausdruck kommt (Schick). Freilich kann, da nähere Angaben nicht vorhanden sind, eine Lues bei Di. Baz. Träger nicht ausgeschlossen werden.

In 3 weiteren Fällen fanden sich sehr ausgedehnte Veränderungen an den Luftwegen. Tonsillen, Uvula, Rachenwand waren geschwollen und mit dicken weißen, z. T. schmutzig-bräunlichen Belägen bedeckt. Es fanden sich Ulcerationen, stinkender Fötor. In allen Fällen außerdem eine schwere Nieren-schädigung mit massenhaft Eiweiß, hyalinen und granulierten Zyl., Erythr. und Leuk.

Der 1. Pat. kam trotz Serumbehandlung (8000) bereits am 2. Tag ad exitum, Cardiaca hatten keinerlei Wirkung. Die Sektion ergab keinerlei Herzveränderungen, aber Lungenödem mit bronchopn. Herden, ulcerös-eitrige Entzündung am Kehlkopf. Die Nebenniere zeigte eine sehr schmale und blasse Rinde und blaßes Mark, das Herz starke Anämie.

Im 2. Fall handelte es sich um ein 6 Jahre altes Mädchen, das am 3. Krankheitstag mit Serum behandelt wurde. Bei Einlieferung am 6. Tag fanden sich im Rachen ausgedehnte blutige Beläge und Ulcera, außerdem süßlicher Fötor. Es trat Nasenbluten auf, ebenso stellten sich Blutungen aus dem Rachen und dem Zahnfleisch ein. An der Injektionsstelle bildete sich ein Hämatom, Petechien und Suffusionen fanden sich auch noch an anderen Körperstellen. Die Mandibulardrüsen waren sehr stark geschwollen, die Schwellung reichte bis zur Parotis. Das Bewußtsein war nicht klar. Die Temp. betrug 36°. Das Blutbild zeigte 2,9 Mill. Erythr., 60% Hgl., 26000 weiße Blutkörperchen, davon 14% Lym-

phocyten. Außerdem fand sich eine starke Verminderung der Blutplättchen. Die Herztätigkeit war sehr schlecht, bereits am 2. Aufenthaltstag erfolgte der Tod. Bei der Sektion fand sich eine kleinzellige Infiltration der Interstitien in den äußeren Schichten des Herzm., in der Tiefe keine wesentlichen Infiltrationen. Im ganzen Pharynxbereich hämorrhagische Entzündung unter der intakten Schleimhaut. Die Nebennierenrinde enthielt wenig Lipoid. — Es handelte sich in diesem Fall um eine schwere toxische Di. mit hämorrhagischer Diathese. Das Di. Toxin schädigt die Gefäßwand, setzt die Blutgerinnungsfähigkeit herab und vermindert die Blutplättchen (nach Bokay).

Beim 3. Fall bestand ebenfalls ein schwerer Rachenbefund mit starker Drüenschwellung. Es entleerte sich hämorrhagisches Sputum. Auf einer Seite war die Tonsille durch starke Schwellung absceßartig vorgewölbt. Am 5. und 6. Krankheitstag wurden 9000 E. gegeben. In den nächsten Tagen trat unter Abstoßen der Membranen Besserung ein, nur war die Herztätigkeit immer schwach. Einmal trat nachts ein schwerer Anfall von Herzschwäche ein. Am 12. Krankheitstag nun wird das Kind plötzlich sehr blaß, bekommt Brechreiz und klagt über sehr heftige Schmerzen im Hinterkopf und in der Herzgegend, liegt kurze Zeit somnolent im Bett, ist sehr stark erregt, greift fortwährend nach dem Kopf. Der Mund ist nach rechts verzogen, die Zunge weicht beim Herausstrecken nach links ab, die Sprache bekommt nasalen Klang. Gaumensegel und Zäpfchen hängen schlaff herunter. Der l. Arm kann nicht aktiv bewegt werden, er ist ebenfalls völlig schlaff. Der Puls ist sehr klein und langsam. Kurze Zeit darauf trat der Tod ein. Eine Sektion wurde nicht vorgenommen. Es handelt sich in diesem Fall wohl um eine Embolie infolge Thrombenbildung im Herzen.

Manche Autoren nehmen an, daß die Gerinnungsfähigkeit des Blutes durch das Toxin erhöht ist und daß Endothelverletzungen eintreten können. Dadurch kommt es entweder zur Thrombosierung von Hirngefäßen oder zur Thrombenbildung im Herzen. Dazu steht eigentlich im

Gegenſatz die geringe Anzahl von Fällen, die ſich in der Literatur finden. Baginsky und Hennoch (2) erwähnen nur je 3 Fälle, Zifchinsky (58) 8. Leede (22) fand unter 6300 Fällen 4. Man kann es ſich nur ſo erklären, daß eben toxiſch ſo ſchwer Geſchädigte vor Ausbildung von Thromben bereits zu grunde gehen, andererseits ſteht auch gerade die Tatſache dazu im Gegenſatz, daß ſich bei beſonders ſchweren Fällen eine hämorrhagiſche Diathefe findet. Erwähnt wird in der Literatur, daß meiſt die rechte Körperſeite bei cardial ſchwer geſchädigten Kindern betroffen iſt mit Facialislähmung und mit ſehr heftigen Schmerzen. Andere nehmen an (Thiele, Harmel nach Baginsky), daß hämorrhagiſche bzw. encephaliſch-hämorrh. Prozeſſe daran ſchuld ſeien. Nach Örtel (22) beſtehen die Veränderungen in einer hyalinen Degeneration der Gefäßwandungen, die dadurch leichter zerreißen. Seifert (22) glaubt, daß das im Blut kreisende Toxin teils Erweichungen der Hirnſubſtanz, teils entzündliche Veränderungen an den Gefäßwänden mit Diapedeſe der Blutkörperchen bewirken und ſo kleinere oder größere Blutungen hervorrufen kann.

Die 3 leztgenannten Di. Fälle und der früher erwähnte in Heilung ausgehende mit dem ſchweren lokalen und allgemeinen Befund entſprechen am eheſten dem, was man im allgemeinen als maligne, ſeptiſche oder, wie Bormann (5) ſagt, als invaſive Di. bezeichnet.

Zunächſt noch zu den 5 Sektionsbefunden bei den Herztodesfällen. Es iſt bemerkenswert, daß in 3 Fällen von Frühtod ein Nebennierenbefund im Sinne einer Lipoidarmut und Atrophie vorhanden iſt. Dies würde darauf hinweiſen, daß den Nebennieren doch eine wichtige Funktion in der Bekämpfung der Intoxikation zukommt und daß ſie auch für die Vaſomotorenſchwäche mitverantwortlich ſind. In 3 Fällen fand ſich eine deutlich ausgeprägte Dilatation des Herzens. Friedemann (9) führt dieſe Tatſache auf eine Sympathicuslähmung zurück. Sie ſoll Teilerſcheinung der allgemeinen Vaſomotorenlähmung ſein. Durch Nachlaſſen des ſympathiſch bedingten Herzmuskeltonus ſoll es zur akuten Erweiterung kommen. Bei dem

Kranken, der am 9. Tag starb, fand sich bereits der Beginn einer Myokarditis, bei 1 Sektionsfall am 12. Tag war die Myolyse und die interstitielle Myokarditis schon deutlich ausgesprochen.

Man könnte also allgemein sagen, daß wohl die Vasomotoren[schädigung bei den Fröhrtodesfällen eine bedeutende Rolle spielt. Ob zentral oder peripher, ob Sympathicuslähmung oder Nebennierenin[suffizienz ist klinisch nicht zu unterscheiden und auch nicht von Belang. — Es läßt sich aber auch denken, daß das Toxin makr. und mikr. nicht nachweisbare Veränderungen am Herzmuskel und besonders auch am Reizleitungssystem setzt, die trotzdem die schwersten Funktionsstörungen hervorrufen können. Hält der Organismus längere Zeit dieser schädlichen Wirkung stand, dann kommt es zur Ausbildung sichtbarer Erscheinungen im Sinne einer Myolyse oder Myokarditis. Im übrigen wurde schon erwähnt, daß bei einem Todesfall nach 5 Wochen keinerlei Veränderungen am Herzen festgestellt werden konnten, sodaß man also nicht sagen kann, daß Fröhrtodesfälle ausschließlich durch Vasomotoren[schädigung, Spättodesfälle durch Myokarditis hervorgerufen werden.

Was nun die eigentliche maligne oder invasive Di. anlangt, so stehen nach Bokay (4) und Riet[schel (29) die meisten Autoren auf dem Standpunkt, daß das schwere Krankheitsbild der Di. Baz. allein hervorrufen kann. Bormann (5) und einige andere Autoren glauben, daß es durch einen Mischinfekt mit Streptococcen hervorgerufen werde. Nach Königsberger (17) findet man, wie auch in einigen unserer Fälle, reichlich Strept. und Di. Baz. bei weißen Belägen und ganz harmlosen Erscheinungen von seiten der Di. Bei ulcerösen und gangränescierenden Fällen findet man aber Di. Bac. in Reinkultur. Auch bei 4 von unseren Fällen wurden keine Strept. gefunden. Die meisten Autoren weisen darauf hin, daß das Krankheitsbild durchaus nicht dem Bild einer Strept. Sepsis entspricht. Bei den reinen Formen sterben die Kinder genau

unter den gleichen Symptomen wie bei den Formen, wo sich Strept. im Abstrich bzw. auch vereinzelt im Blut finden. Die Strept. können daher nicht die primäre Ursache der Malignität sein.

Von großer Bedeutung für die Erklärung der malignen Di. sind die Befunde von Langer und Kirch.

Langer (20) wies durch experimentelle Untersuchungen nach, daß das Toxin in solchen Fällen eine viel stärkere Bindungstendenz an Körpergewebe, eine ungleich höhere Avidität zu den Körperzellen hat. Schon kurze Zeit nach der Toxininj. ist die Toxinwirkung durch das nachfolgende Antitoxin nicht mehr aufzuhalten.

Es ist besonders bemerkenswert, daß toxische Erscheinungen fast nur bei Rachendi. auftreten, bei Larynxdi. dagegen fast nur, wenn zu gleicher Zeit auch eine Rachen- oder Nasendi. besteht. Dies kam besonders deutlich bei dem Fall zum Ausdruck, wo ein ganzer Ausguß der Trachea und der Bronchien ausgehustet wurde. Wenn ganz allgemein der Satz zurecht bestünde, daß bei starker Ausdehnung der Membranen auch eine starke Toxinwirkung zustande komme, so hätte man in diesem Fall eine besonders starke Giftwirkung erwarten müssen. Von einer solchen war aber überhaupt nichts nachzuweisen.

Kirch (15 u. 16) fand nun, daß bei Larynxdi. sich der Entzündungsprozeß nur am Oberflächenepithel abspielt, da eine hyaline Grundmembran das Vorwärtsdringen verhindert. Auch die Di. Baz. halten sich nur an der Oberfläche auf. Die Beläge sitzen hier daher nur locker auf und lassen sich mühelos abtrennen. An den Plattenepithelien des Nasen- und Rachenraumes dagegen ist diese Membran nicht vorhanden. Daher greift hier der Prozeß in die Tiefe, die Beläge haften fest auf ihrer Unterlage. Kirch konnte nun in vielen Fällen bei Rachendi. tief im lymphatischen Gewebe und in der Muskulatur Di. Baz. nachweisen. Wenn die Baz. so weit in die Tiefe eindringen, so ist nach Kirch ohne weiteres anzunehmen, daß sie leicht auch in die kleinen Blutgefäße, die durch den Entzündungsprozeß bereits geschädigt sind, und weiter in die Organe gelangen

können. Kirch konnte in vielen Fällen von Rachendi. Di. Baz. im Innern des Körpers, besonders im Herzen und in der Niere, nachweisen, dagegen nicht bei Larynxdi. Auch bei uns konnten bei dem Fall mit hämorrhagischer Diathese Di. Baz. in Leber und Milz gefunden werden, in Herz und Niere war der Befund stark verdächtig.

Es ist klar, daß auch in den Fällen, wo es nicht zum Eindringen von Baz. kommt, wenigstens die Toxine gerade am Plattenepithel besonders leicht in die Tiefe und damit ins Blut gelangen können. Besteht nun eine besonders starke Avidität der Toxine zu den Körperzellen und eine rasche und intensive Giftbildung, so kommt es sehr schnell zur Nekrose, zu Blutungen aus den Kapillaren und damit zu schmutzig-brauner Verfärbung der Di. Membranen, zum Eindringen in die Blutbahn. Infolge der starken Gefäßschädigung gelangen auch Di. Baz. in die Blutbahn und, wie Kirch nachgewiesen hat, vor allem ins Herz. Vielleicht besteht eine besondere Organotropie des Toxins und des Baz. zum Herzen. Es kommt durch das im Herzm. selbst entstehende Toxin im Verein mit dem des Blutes zu einer besonders starken Giftwirkung. Die dosis letalis der einzelnen Zellen wird dadurch sehr rasch erreicht und überschritten und so kommt es zu deren Funktionsausfall und damit zu schwerster Herzschädigung.

Wenn Di. Baz. ins Blut eindringen, so ist es klar, daß auch andere zufällig vorhandene Mikroorganismen, vor allem Strept., hineingelangen können. Dies ist aber nur von nebensächlicher Bedeutung, alle Krankheitserscheinungen können durch den Di. Baz. und sein Toxin allein erklärt werden, Zeichen einer Strept. Sepsis finden sich nicht. Wohl aber können bei den lokalen Erscheinungen Strept. und andere Organismen eine Rolle spielen. Sie können sich in dem geschädigten Gewebe ansiedeln und zur Entwicklung ulceröser Prozesse beitragen. Vielleicht tragen auch Strept. dazu bei, daß es rascher zum Einbruch von Toxinen und Bakt. in die Blutbahn kommt oder daß Blutaustritte und schmutzige Färbung der Membranen entstehen, da man bei anderen Fällen die gleichen Allgemeiner-

nungen, aber lokal geringere Symptome und weiße Beläge findet. Das Primäre und Entscheidende der schweren toxischen, malignen Di. ist aber wohl der Di. Baz. mit seiner hohen Avidität und intensiven Giftproduktion, da in den meisten Fällen das gleichzeitige Vorhandensein von Strept. und Di. Baz. keinen Einfluß auf das Krankheitsbild ausübt.

Vielleicht könnte man auch manche Fälle von späteintretenden Lähmungen und Herzmuskelschädigungen sich so erklären, daß sich im Körper ein Di. Baz. Depot findet, das nach Abheilen der lokalen Di. weiter Toxin bildet. Durch Kumulation dieser, wenn auch geringen Toxinmengen, könnte es dann zum späten Auftreten dieser Erscheinungen kommen.

Nun noch allgemeine Bemerkungen über die Di. Fälle. Was zunächst das Ergebnis der bakteriologischen Untersuchung betrifft, so kam es nicht allzu selten vor, daß auch bei schwerer Di. der 1. Abstrich neg. ausfiel. Erst weitere Untersuchungen ergaben ein pos. Resultat. Man sollte sich daher niemals, wie es in einigen Fällen vor der Einlieferung geschah, durch einen neg. Baz. Befund vor der Seruminj. abhalten lassen, wenn der klinische Befund dafür spricht. Hottinger (11) fand in 13 % beim 1. Abstrich ein neg. Ergebnis. Was für den Beginn der Erkrankung gilt, gilt auch für den Nachweis des Freiseins von Baz. Auch wenn der Abstrich mehrmals neg. ausgefallen ist, so ist das noch kein Beweis für das Freisein von Baz. Prip (33) konnte bei Nachuntersuchung von baz. frei Entlassenen in 60 % Di. Baz. finden. Soweit Angaben vorhanden sind, wurden in $\frac{1}{3}$ der Fälle nach 14 Tagen, in einem weiteren Drittel nach 3 Wochen keine Baz. mehr gefunden. In einigen Fällen war der Abstrich noch nach 7—8 Wochen pos. Die Behandlung der Baz. Träger mit KMNO_4 , H_2O_2 , Trypaflavin, Ortizon war in hartnäckigen Fällen ohne Erfolg.

Was die Diagnosenstellung anlangt, so wurden mit ganz wenigen Ausnahmen die Kinder, soweit sie nicht gleich in die Klinik gebracht wurden, mit der Diagnose Di. eingewiesen. In 3 Fällen mit schwerer Atemnot, Stridor, Cyanose, Krupphusten, Einziehungen war Bronchitis und

Bronchopneumonie angenommen worden. Schwer kann die Diagnose sein bei der sogenannten malignen Di., wenn man nur den lokalen, nicht auch den allgemeinen Befund beachtet. Gerade in diesen Fällen findet man manchmal eine besonders starke Vorwölbung einer Tonsille, sodaß oft die geschwollene Tonsille für einen Mandelabszeß gehalten wird. So wurde ein Pat. eingeliefert mit der Angabe, daß er vor 8 Tagen einen Mandelabszeß und anschließend daran eine Mundfäule gehabt habe. Der Pat. starb wenige Stunden nach der Einlieferung an Herzschwäche. Sicherlich hat es sich in diesem Fall um eine schwere ulceröse Rachendi. gehandelt.

Blutbilder wurden nur in geringer Zahl angelegt. In besonders leichten Fällen fand sich keine Veränderung des Blutbildes. Sonst fand sich eine mehr oder weniger starke Hyperleukocytose, die Höchstzahl war 27 300. Die Eosinophilen fehlten auf dem Höhepunkt des Krankheitsbildes fast in allen Fällen. Besonders ausgesprochen war fast immer auch eine Lymphopenie, so betrug sie bei einem 3jährigen Kind 14 %. Ferner waren in einigen Fällen auch die Monocyten vermehrt. Mit Besserung des Krankheitsbildes stellen sich auch im Blutbild wieder normale Verhältnisse her. In einem Fall von Rachendi. bei einem 3½ jährigen Kind wurden systematische Untersuchungen gemacht mit folgendem Ergebnis:

	4. Kr. Tag	5. Kr. Tag	7. Kr. Tag	8. Kr. Tag	9. Kr. Tag
Leuk.	20760	18720	17440	15860	15440
Eosin.	keine	keine	7%	10%	10%
Lymph.	14%	19%	27%	27%	30%
Segm.	54%	44%	30%	28%	20%
Stab.	23%	18%	23%	17%	13%
Monoc.	16%	15%	9%	8,7%	7%

Ein Unterschied im Blutbild in Fällen, die ad exitum kamen, und solchen, die einen günstigen Verlauf nahmen, wurde nicht festgestellt. Auffallend sind zunächst die hohen Leukocytenwerte mit Linksverschiebung des Blutbildes. Besonders deutlich kommt die Lymphopenie bei kleinen Kin-

dern zum Ausdruck. Nach v. Albertini bindet sich das Gift in erster Linie an das lymphatische Gewebe und an die freien Lymphoc., deren Hauptaufgabe die Bindung von Zellgiften sei. Daher komme es zum Absinken der Lymph. Zahl. Auffallend sind auch noch die hohen Monocytenwerte. Königsberger betont, daß bei Mononucleose hohe Mortalitätswerte vorhanden seien. In 1 Fall von Rachendi. mit geringen Erscheinungen wurden 16 % gefunden, bei einem ad exitum kommenden 6 %. Auch bei den Eosinophilen wurde kein Unterschied zwischen leichten und schweren Fällen gefunden. Es ist also zu sagen, daß das Blutbild für die Prognose quoad vitam eines Falles nicht verwertet werden kann, daß sich eine Blutveränderung nur in deutlich ausgeprägten Fällen, allerdings nicht konstant, findet.

Über die Dauer der Erkrankung sind schwer Angaben zu machen, da in vielen Fällen die Kinder schon vor vollständigem Abheilen der Krankheit aus der Klinik entlassen wurden unter entsprechenden Verhaltensmaßregeln bzw. durch Überweisung an den Hausarzt. Die Dauer richtet sich vor allem natürlich nach der Schwere der Erkrankung, vor allem nach den Komplikationen von seiten des Nervensystems, des Herzens und der Niere. Im allgemeinen betrug der Klinikaufenthalt 2–3 Wochen. Es ist daher auch möglich, daß in dem einen oder anderen Fall zu Hause sich noch eine Herz-, Nieren- oder Nervenschädigung einstellte, zumal in einigen Fällen die Kinder gegen ausdrücklichen ärztlichen Rat aus der Klinik genommen wurden.

Was die Frage der Geschwistererkrankungen anlangt, so blieben von 55 Familien, soweit Angaben vorhanden sind, bei 49 die Di. Erkrankungen auf 1 Kind beschränkt. Es waren noch 117 gesunde Geschwister neben den an Di. Erkrankten vorhanden. Nur in 6 Familien wurden weitere Kinder von der Krankheit ergriffen, in ihnen waren 21 Kinder vorhanden, davon waren 17 erkrankt. In 1 Fall waren 3 Schwestern erkrankt, nur das 1/2 jährige Schwesterlein blieb davon verschont. Im allgemeinen waren die Geschwistererkrankungen der Schwere nach gleich. In 9 % der Familien fanden sich also weitere Erkrankungen, davon waren 3 % simultan, 6 % successiv,

d. h. die Erkrankungen folgten im Abstand von einigen Tagen. Chura (7) fand in 91,5 % die Erkrankung auf ein Kind beschränkt, bei den Mehrerkr. waren 6 % simultan, 2,5 % successiv. Die entsprechenden Zahlen von Moldovan (7) sind: 92,8 %; 5,24 %; 1,9 %.

Für die Frage der Di. Erkrankung sind die humoralen und lokalen Abwehrkräfte von der größten Bedeutung. Wie oben erwähnt, findet sich bei 84 % der Neugeborenen im Blut Antitoxin, daher die rel. seltene Erkrankung der Säuglinge und das Verschontbleiben auch bei Erkrankung der übrigen Geschwister. In vielen Fällen wird diese natürliche Immunität im 1. Lebensjahr verloren gehen. Nach Groer und Kassowitz (4) betrug sie im Alter von 1—3 Jahren noch 28 %. Bei einer bestimmten Anzahl von Personen wird sich bei besonders günstigen Bedingungen diese natürliche Immunität durch das ganze Leben erhalten. Familiäre und erbliche Verhältnisse spielen dabei sicher eine bedeutende Rolle.

Die Infektion mit Di. Baz. kann unter dem Einfluß guter lokaler Abwehrvorrichtungen oft ohne klinische Erscheinungen verlaufen. Der Körper ist imstande, das Eindringen der Baz. zu verhindern und sie in ihrer Tätigkeit zu hemmen. Werden nun diese lokalen Abwehrvorgänge geschwächt, sei es durch einen lokalen Schleimhautprozeß oder auch durch eine allgemeine Krankheit, so tritt eine Di. Erkrankung ein. Sicherlich sind so eine Anzahl von Hausinfektionen in Krankenhäusern zu erklären. Außerdem spielen natürlich auch Baz. Träger eine bedeutende Rolle.

An der Erlanger Kinderklinik wurden 9 Hausinfektionen beobachtet. Es handelte sich fast durchwegs um leichte Fälle. Nur in 1 Fall kam es zu einer Kehlkopfstenose, die aber rasch verschwand. Einmal kam es zum Kollaps, der aber bald durch Cardiaca behoben werden konnte. An dem günstigen Verlauf mag wohl zum großen Teil die frühzeitige Seruminj. schuld sein.

Die Bedeutung der lokalen Abwehr ergibt sich aus den Fällen von Autoinfektion. Hier wurde ein derartiger Fall beobachtet. Das Kind hatte ein Ekzem hinter

dem Ohr. Es bildeten sich schließlich dicke grau-weißliche Beläge und der Abstrich ergab Di. Baz. Auf der Nasen- und Rachen Schleimhaut fanden sich keinerlei Anzeichen einer Erkrankung, wohl aber wurden im Nasenabstrich Di. Baz. gefunden. Sicher wurden von hier aus durch Schmierinfektion Baz. auf die Epithelläsion übertragen und hier kam es infolge mangelnder Abwehr zur Ausbildung diphtherischer Membranen. Laujecker (21) schildert ebenfalls 2 Fälle von Autoinf. bei Di. Baz. Trägern.

In den meisten Fällen bildet sich aber wohl bei Anwesenheit von Baz. im Rachen Antitoxin im Sinne der stillen Feiung aus. Man kann wohl annehmen, daß sich kein Antitoxin bildet, wenn die lokale Abwehr so stark ist, daß der Baz. bzw. sein Toxin überhaupt nicht die Möglichkeit hat, die humoralen Abwehrkräfte des Körpers anzuregen oder daß diese auf den schwachen Anreiz nicht reagieren. Im anderen Fall ist wohl die lokale Abwehr nicht in so ausgesprochenem Maß vorhanden; es gelangen ganz geringe Mengen von Toxin ins Blut und diese genügen, um die Antitoxinproduktion des Körpers anzuregen.

Was nun die Di. Recidive betrifft, so muß man unterscheiden zwischen Frührecidiven und solchen, die erst nach Monaten und Jahren auftreten. Nach Schick fällt der Zeitpunkt der ersteren mit der Ausscheidung des passiven Heilserums, etwa in der 3.—4. Woche, zusammen. Aktive Schutzstoffe stehen noch nicht zur Verfügung. Konstitutionelle Faktoren spielen dabei natürlich eine sehr bedeutende Rolle.

In 1 Fall von schwerer Larynxdi. trat nach deren Abheilung nach 4 Wochen neuerdings eine Nasendi. auf, die mit Erschwerung der Atmung, mit Krusten und Borkenbildung und mit blutigem Sekret einherging. In einem weiteren Fall von Rachendi. traten in Abständen von etwa 1 Monat noch 4 mal Rachendi. auf, die zwar leicht verliefen, aber jedesmal deutliche grau-weißliche Beläge an den Tonsillen aufwiesen. Serumbehandlung und auch Inj. von Reizkörpern konnten ein Wiederauftreten nicht verhindern, ebensowenig konnten durch Lokalbehandlung mit

Trypaflavin die Di. Baz. aus dem Rachen entfernt werden. In einem solchen Fall muß man schon annehmen, daß der Körper überhaupt nicht oder nicht in genügendem Ausmaß fähig ist, Antitoxin zu bilden oder längere Zeit festzuhalten. — Bei den Recidiven, die erst nach längerer Zeit sich einstellen, handelt es sich wohl in den meisten Fällen um eine neue Infektion, wenn auch daran zu denken ist, daß bei Baz. Trägern durch Auflockerung der Schleimhaut bei katarrhalischen Affektionen eine neue Erkrankung erfolgen kann, wenn eben kein Antitoxin vorhanden ist. Die Recidive verlaufen im allgemeinen günstiger als die Erst-erkrankung, weil eben doch bereits ein gewisser Schutz vorhanden ist.

Verschont von einer neuen manifesten Erkrankung werden solche, die zwar auch kein Antitoxin im Blut besitzen, aber es sofort bei neuer Berührung mit Di. Baz. bilden können. Man spricht, in diesem Fall von potentieller Immunität. Bei einem Fall von Larynxdi. entstand nach 10 Monaten eine Rachendi., die aber einen leichten Verlauf nahm.

Über die Häufigkeit der Recidive werden nach Bokay Zahlen von 0,2—5,8% angegeben. Nach Opiř u. Mayer (4) soll an der Häufigkeit der Recidive die Drosselung der Selbstföiung durch frühzeitige Seruminj. schuld sein.

Zusammenfassend ist über die Letalität bei den 106 Di. Erkrankungen zu sagen:

Von den an Di. erkrankten Kindern sind 17 gestorben. Davon gehen 2 ab (1 Tod an Pneumonie und Empyem, 1 an Tumor cerebri), die nur eine ganz leichte Di. hatten.

Von den übrigen entfallen 11 auf toxische Herz- und Kreislaufschädigung, darunter 1 an Embolie; 2 auf descendierenden Krupp und Lungenkomplikation; 2 auf Lähmungen (1 Zwerchfellähmung, 1 Schluckpneumonie). Die Gesamtletalität betrug also 14%.

5 wurden moribund eingeliefert und starben noch am Einlieferungstag, weitere 5 starben am 2. Aufenthaltstag, 2 am 3., 1 am 4. und 1 am 9., 1 auswärts nach 3 Wochen.

Dem Alter nach waren 10 zwischen 0—5, 5 zwischen 6—9 Jahren. Auf die einzelnen Jahrgänge verteilt ergibt sich folgendes:

1925	1926	1927	1928	1931—1933	1934
2	1	3	2	je 1	4

Dem Geschlecht nach waren 9 Mädchen, 6 Knaben. —

Von den Gesamterkrankten waren 63 zwischen 0—5, 43 zwischen 5—10 Jahre alt. 49 waren Mädchen, 55 Knaben.

Die Zahl der Erkrankungen verteilt sich auf die einzelnen Jahre:

1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
18	8	13	13	8	3	4	8	11	20

Über die Serumtherapie ist zusammenfassend folgendes zu sagen:

Bei den Todesfällen wurden in 3 Fällen keine Seruminj. gemacht, in 2 fanden sich keine Angaben hierüber, in 2 weiteren waren Menge und Zeitpunkt der Inj. nicht angegeben. In den übrigen wurden Serummengen von 7 bis 18 000 E. zwischen dem 2.—6. Tag gegeben.

Sonst wurde in den meisten Fällen Serum intramuskulär in den Oberschenkel gegeben, ev. bei größeren Mengen in beide. Nur bei ganz leichter Nasendi. wurde die Inj. unterlassen. In leichten Fällen wurden 2—4000, in mittleren 6—8000, bei schwer toxischen Fällen und Larynxdi. bis 20 000 E. gegeben. Meist wurde die Gesamtmenge an 1 Tag verabreicht, nur wenn eine weitere erhebliche Verschlimmerung eintrat, erfolgte eine Wiederholung in den nächsten Tagen. Rücksicht auf Gewicht und Alter wurde bei der Dosierung nicht genommen, ausschlaggebend war allein die Schwere der Erkrankung.

Die Dosen schwanken bei den einzelnen Autoren sehr. Hösch (4) glaubt, daß Serumdosen über 4000 nichts nützen, da sie den Tod doch nicht aufzuhalten vermögen. Kleinschmidt (4) bezeichnet Dosen über 10 000 als Luxusangebot. Schick glaubt, daß mit 500 E./kg das Gewebe mit Antitoxin gesättigt sei. Andere Autoren, besonders Franzosen und Dänen, geben in schweren Fällen Dosen, die in die 100 000 gehen. Im allgemeinen werden aber die oben angegebenen Dosen angewandt.

Schädliche Wirkungen des Serums wurden in keinem Fall gesehen. Nur in 1 Fall stieg die Temp. um 2 Grad, in

einigen anderen bis zu 1 Grad. In allen übrigen Fällen trat keine Temperatursteigerung ein, im Gegenteil, es kam zum Absinken.

Serumexanthem trat in 8 Fällen auf und zwar am 5.—8. Tag nach der Inj. Es dauerte 2—3 Tage, Temperatursteigerung erfolgte dabei nur in 1 Fall auf 40 Grad, in einigen anderen um $\frac{1}{2}^{\circ}$. Allgemeinbeschwerden bestanden meist nicht, nur geringes Hautjucken. Abhängigkeit von der Serummenge war nicht nachzuweisen, da es bei Mengen von 4—18000 auftrat. 5 Mädchen und 3 Knaben waren dabei betroffen. In allen Fällen handelte es sich um ein großfleckiges, hellrotes, urtikariell-erhabenes Exanthem, das über den ganzen Körper sich ausdehnte. Es war im allgemeinen sehr flüchtig, verschwand an einer Stelle und flammte an einer anderen wieder auf. In 1 Fall fand sich nur an der Inj. Stelle ein fleckiges Exanthem.

In 1 Fall war bereits vor einem Jahr eine Seruminj. gemacht worden. 8 Tage nach der 2. Inj. trat ein umfangreiches Exanthem auf. Gleichzeitig entstand Erbrechen, Blässe im Gesicht und kleiner Puls. Es trat aber sehr rasch Besserung ein. In einem anderen Fall von Nasendi. waren 1000 E. inj. worden. Nach 17 Tagen trat nach einer Serumtamponade wenige Stunden später ein weitausgedehntes Exanthem ohne Störung des Allgemeinbefindens auf.

Die Häufigkeit betrug nach Abzug der Fälle, die für ein Exanthem nicht in Betracht kommen, 10%. Nach Giertmühlen (10) fand Hartung 21%, Daut 11%, Rittershain 6,5%; Giertmühlen fand unter 2700 10%. Hartung sah bei 24% Fieberfreiheit, Giertmühlen bei 60%. In unseren Fällen bestand in 75% kein Fieber. 4 Fälle ereigneten sich 1925, 1 1927 und 3 1934. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit der Herstellung des Serums.

Was nun die Wirkung des Serums im einzelnen betrifft, so war in fast allen Fällen am Tage nach der Injektion ein Rückgang der Temp. festzustellen und zwar teils ein kritischer, teils ein lytischer Abfall zur Norm. Die Schwellung der Lymphdrüsen ging zurück, es trat eine unterschiedene Besserung des Allgemeinbefindens ein, vor allem

auch Rückgang der Pulsfrequenz. In den meisten Fällen nahmen auch die Beläge nicht mehr an Ausdehnung zu, nur in einigen Fällen kam es noch zu einer geringen Verbreiterung. Nach Schick kommt das mehr als 6 Stunden vor der Inj. produzierte Gift noch voll zur Auswirkung. Die entzündliche Reaktion ist die Folge des nicht mehr beeinflussten Giftes, das zur Zeit der Inj. noch nicht den Höhepunkt seiner Wirksamkeit erreicht hatte. Es ist daher nicht als Mißerfolg des Serums aufzufassen, wenn die Belagdicke und Ausdehnung nach der Inj. noch etwas zunimmt. In den meisten Fällen wird es sich aber bei größerer Ausbreitung um zu geringe Serumdosen handeln.

Der Rückgang der Beläge setzte meist am 2.—3. Tag ein und zog sich oft längere Zeit hin. Die Abstoßung der Beläge ist nach Bormann (6) nicht die eigentliche Wirkung des Serums, sondern sie ist auf dem Umweg der Entgiftung des Körpers zu erklären. Durch das Serum wird der Körper von Toxin befreit. Er kann nun seine antibakteriellen Kräfte, die bis jetzt vom Toxin gehemmt wurden, in Aktion treten lassen und mit ihrer Hilfe die Lösung der Membranen zustande bringen. Bei schweren Larynxdi., die bereits starke Stenoseerscheinungen zeigen, kommt daher die Inj. zu spät, das Leben kann nur durch die Tracheotomie gerettet werden.

Ob das Serum bei schwer toxischen Fällen überhaupt noch wirken kann, ist ganz abhängig von der Giftdosis, die dem Körper bereits einverleibt wurde. Ist nach Schick die Dosis letalis noch nicht erreicht, so kann der Kranke ohne weiteres gerettet werden. Ist sie bereits erreicht, dann können wir ihn nur retten, wenn wir wenige Stunden darnach zur Inj. kommen und eine rel. große Menge injizieren. Ist aber die Dosis letalis schon überschritten, dann halten wir zwar die weitere Vergiftung auf, reißen vielleicht auch eine gewisse Menge Gift noch aus den Zellen, der Tod ist aber nicht mehr aufzuhalten. Die Bindung des Toxins ist irreversibel, die Schädigung lebenswichtiger Organe mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Auch die höchsten Serumdosen können dagegen nichts mehr ausrichten. Wenn

eine Seruminj. bereits nach 24 Stunden das Leben nicht mehr retten kann, so ist das keineswegs ein Beweis für die Wertlosigkeit des Serums, sondern dafür, daß es eben noch früher hätte gegeben werden sollen, auch keineswegs ein Beweis dafür, daß hier noch andere Erreger, etwa Strept., mit im Spiele sein müssen. Man hat in diesen Fällen auch Symbioseserum verabreicht, d. h. eine Kombination von Di.- und Strept. Serum. Die Ergebnisse sind aber nach dem Urteil fast aller Autoren keineswegs besser. Auch Königsberger (36), der früher über günstige Erfolge berichtete, hat neuerdings dies verneinen müssen. Virulenz der Erreger, Avidität des Toxins zu den Körperzellen, konstitutionelle und dispositionelle Momente geben den Ausschlag. Treffen alle diese Faktoren zu Ungunsten des Organismus zusammen, so kann die Dosis letalis schon in wenigen Stunden erreicht und damit das Serum wirkungslos sein. Glücklicherweise ist das nur in seltenen Fällen der Fall, in den meisten hat das Serum noch nach Tagen heilende Wirkung.

Wenn wir unsere schweren Di. Fälle hinsichtlich des Zeitpunktes der Inj. nach Beginn der Erkrankung betrachten, so ergibt sich folgendes Bild:

Die Tracheotomie war bei Fällen notwendig, die später zur Behandlung kamen als die übrigen Larynxdi. Fälle. Bei den Lähmungen wurde kein Serum gegeben mit 1 Ausnahme (am 6. Tag), als eine lokale Di. bestand, sondern erst nach Ausbruch derselben. Bei den Herztodesfällen wurde bei 5 Kindern kein Serum verabreicht. Auch in den meisten übrigen wurde es erst längere Zeit nach Beginn der Erkrankung gegeben. Daraus erklärt sich die hohe Letalität der toxischen Fälle. Oft wurde kein Serum inj., sondern die Kinder gleich in die Klinik eingeliefert, in anderen Fällen wurde erst in den folgenden Tagen der Behandlung von den Ärzten Serum verabreicht. Es kam dadurch zu nicht geringen Zeitverlusten. Die Serumdosen, 1500—4000 in den meisten Fällen, waren bei schweren Erkrankungen zu gering. Da in schweren Fällen nicht Tage, sondern Stunden entscheiden, so sollte der Arzt stets seine

Serum[spritze bei sich haben, damit er bei dringendem Verdacht einer Di. sofort eine genügende Menge inj. kann.

Von den übrigen Fällen hätten sich sicher noch so und so viele zu schweren entwickelt, Tonillendi. hätten zu Larynxstenosen oder zu Herz-, Nerven- und Nierenkomplikationen geführt, wenn sie nicht rechtzeitig mit genügenden Dosen behandelt worden wären. Deshalb ist eine Einteilung der Di. in lokalisierte, progrediente und toxische Di. Fälle sicher in hohem Maße durch die Seruminj. bedingt. Freilich spielen die oben erwähnten Momente eine sehr bedeutende Rolle und so wird es immer Fälle geben, bei denen auch eine denkbar frühzeitige Behandlung bereits zu spät kommt.

Die Wirksamkeit des Serums ergibt sich nach Spranger (54) aus Angaben der Baginskyklinik: Infolge der Serumanwendung war hier die Letalität von 48% seit März 1894 auf 15% gesunken. Im August 1894 war der Serumvorrat aufgebraucht, auch im Sept. konnte kein neues Serum beschafft werden. Sofort schnellte die Letalität auf 52% hinauf und sank unmittelbar nach Wiedereinsetzen der Serumbehandlung steil ab.

Wie sehr es auf den Zeitpunkt der Inj. ankommt, ergibt sich aus einer Letalitätsstatistik nach Baginsky:

1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag
0%	6%	12,7%	16,5%	18,5%	31%.

Mit jedem Tag des Zuwartens steigt die Sterblichkeit auf Werte an, die der Letalität der Vorserumzeit entsprechen.

Neben der Serumtherapie und der lokalen Behandlung wurde aber auch die Allgemeintherapie nicht vernachlässigt. Bei Zeichen von Herz- und Kreislaufstörungen wurden selbstverständlich Cardica gegeben. Neben einer leichten, salzarmen und reizlosen Kost wurde besonders großer Wert auf eine reichliche Zufuhr von Vitaminen gelegt, Fruchtsäfte, Obst, Levurinoße oder Levurinetten wurden täglich mehrmals gegeben. Auch Calcium lact. wurde oft angewandt. Hydrotherapeutisch gab man meist täglich Wickel und Bäder.

Zum Schlusse erhebt sich noch die Frage, wie es wohl möglich wäre eine Erkrankung an Di. überhaupt zu verhindern, also es soweit zu bringen, daß alle durch stille Feiung immun werden, wie man es in vielen Fällen erlebt. Durch Impfung von Di. Toxin-Antitoxingemischen hat man versucht künstlich eine Immunisierung herbeizuführen. Das Ideale aber wäre es durch rein natürliche Maßnahmen es fertig zu bringen, daß keine Erkrankung an Di. mehr erfolgt. Es gilt daher die Faktoren ausfindig zu machen, die bei der Resistenzsteigerung des Körpers und bei der Immunisierung eine Rolle spielen. In unseren Fällen handelt es sich bei fast allen Kindern um solche, die sowohl in Bezug auf Länge wie auf Alter ein Gewichtsdefizit bis zu 10 kg aufweisen. Besonders das Fettpolster ist oft äußerst mangelhaft ausgebildet. Aus Tierversuchen wurde nun festgestellt, daß Tiere, die längere Zeit ohne Fett ernährt wurden, gegen Infektionen viel empfindlicher waren als solche, die mit Fett ernährt wurden (nach Aron und Gralka) (26). Von großer Bedeutung sind vor allem die Begleitstoffe, die im Fett vorhanden sind, die biologisch hochwertigen Lipotide und die fettlöslichen Vitamine A und D. Reichliche Zufuhr dieser Stoffe erhöhen die Resistenz und steigern die Abwehrkraft des Organismus. Besonders dem Vitamin A, das auch in den Pflanzen als Provitamin (Carotin) vorhanden ist und im Körper, besonders in der Leber, zu Vitamin A aufgebaut wird, wird zugeschrieben, daß sein Fehlen zu Epithelschädigung der Schleimhaut führt und daß deshalb die Infektionserreger viel rascher eindringen können. Bei der schweren Di., wo gleichsam die Schleimhaut weggefressen wird und ausgedehnte Ulcerationen auftreten, könnte man an eine solche Wirkung durch Vitaminmangel denken.

In jüngster Zeit wurden von Polonyi (27) Untersuchungen über den Gehalt der Nebenniere an Vitamin C angestellt bei an Di. erkrankten Meerschweinchen. Dabei ergab sich, daß der Gehalt an Ascorbinsäure bei erkrankten Tieren um $\frac{1}{3}$ niedriger war als bei gesunden. Wird bei ihnen subcutan C-Vitamin verabreicht, so werden die

Di. Symptome gemildert. Die in Lösungen von C gebrachten Di. Baz. erregen je nach der Dauer der Einwirkung überhaupt keine oder nur milde Erkrankung des Meer-schweinchens. Allgemein wurde der Mehrbedarf an Vitamin C bei Infektionskrankheiten und während der Immunisierung festgestellt.

Auch bei den Vitaminen B und D wurden antiinfektiöse Wirkungen gesehen. So wird z. B. Vitamin B besonders auch gegen Furunkulose angewandt.

Bei der Resistenzerhöhung des Körpers und Bildung von Antikörpern wird es sich wohl nicht um die spez. Wirkung eines einzelnen Vitamins, etwa A, handeln, sondern um eine Wirkung der Vitamine in ihrer Gesamtheit in Verbindung mit biologisch hochwertigen Fetten.

Deshalb ist die Zufuhr einer vitaminreichen Nahrung und die Vermeidung jeder Einseitigkeit auch im Hinblick auf die Infektionsabwehrkraft des Organismus wichtig. Man muß auch daran denken, daß es Ernährungsfehler gibt, die nicht grob in Erscheinung zu treten brauchen, die aber doch schon die Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft des Körpers beeinträchtigen können. Jamin (13) weist besonders darauf hin, daß es vor allem junge Leute gebe, die immer satt und doch in irgend einem Sinn dauernd unterernährt seien. Überhaupt sei die Sättigung ein ungenügender Maßstab für die Beurteilung und daher eine dauernde fürsorgliche Überwachung der Ernährung der Jugendlichen notwendig.

Jamin (13) weist ferner noch auf die Schäden der Domestikation hin durch Fernhaltung von den natürlichen Lebensreizen, auf die Angst vor der Erkältung und Abhaltung von Licht und Luft. Wer gesund sei, müsse seinen Körper den natürlichen Reizen der Umwelt anpassen, müsse in dieser Anpassung durch Betätigung fortshreiten und sich die optimale Widerstandskraft durch körperliche Aussetzung zu erhalten suchen.

Besonders wichtig für die Ernährung ist daher die Zufuhr von Fruchtsäften, Obst, frischem Gemüse, vor allem Spinat und Karotten, ferner auch von Butter, Lebertran,

Eiern und sonstigen lipoidhaltigen Stoffen. Nur bei besonders deutlich ausgesprochenem Mangel kommen die konz. Vitaminpräparate wie Vogan, Levurinoße, Cebion und Vigantol in Frage. Daneben spielt die resistenzsteigernde Wirkung von Licht und Sonne, ev. von Höhen Sonne, Gymnastik und Hydrotherapie eine bedeutende Rolle. Dadurch kommt es zur Aktivierung von Stoffen, die in unserer Haut als Vorstufen vorhanden sind, wie man es bis jetzt vom Vitamin D nachgewiesen hat. Sicherlich werden dabei auch noch andere antiinfektiöse Stoffe mobil gemacht, da ja die Haut besonders auch als Bildungsstätte von Schutz- und Immunstoffen gilt. Aber es muß sowohl bei der Zufuhr von Vitaminen wie auch bei der Einwirkung der natürlichen Lebensreize das nötige Maß gehalten und eine allmähliche Steigerung vorgenommen werden, sonst erreicht man gerade das Gegenteil von dem, was man erreichen will.

Freilich spielt bei den ganzen Immunisierungsvorgängen das Erbgut eine sehr bedeutende Rolle. Soll es doch Individuen geben, die keine Antikörper bilden können und die diese Eigenschaft vererben und zwar soll ein Zusammenhang mit der Vererbung der Blutgruppen bestehen. Wenn die Vererbungsverhältnisse einmal klar gelegt sind, so wäre es durch erbgesundheitsliche Maßnahmen möglich solche Individuen auszumerzen. Freilich wird es immer Leute geben, die zu Infektionen stärker disponiert sind als andere. Es wäre aber schon sehr viel gewonnen, wenn es gelänge auf rein natürliche Weise durch entsprechende Ernährung und Abhärtung die Erkrankungsziffer herabzudrücken auf ein Minimum und den Prozentsatz der durch stille Feiung Immunisierten zu erhöhen. Vielleicht wäre es durch derartige Maßnahmen auch möglich wenigstens die schweren toxischen Fälle zu vermeiden, so daß nur eine lokale Reaktion auf den Di. Baz. eintritt und keine toxische Allgemeinwirkung mehr zustande kommt.

Zusammenfassend ist also folgendes zu sagen:

Durch entsprechende Ernährung und Abhärtung ist darauf hin zu arbeiten die Widerstandskraft des Organis-

mus so weit als möglich zu steigern, so daß der Körper auf Infektionen nur mehr mit unter-schwelliger Reaktion antwortet und eine manifeste Erkrankung überhaupt nicht mehr stattfindet. Führt aber einmal die Infektion mit Di. Baz. zur manifesten Erkrankung, so ist das souveräne Mittel im Kampf gegen den Erreger das Di. Serum. In jedem Fall, wo begründeter Verdacht auf Di. besteht, muß eine Seruminj. in genügender Dosis gemacht werden. Die bakteriologische Untersuchung darf nicht abgewartet werden, auch bei negativem Ausfall darf man sich in seiner Diagnose nicht irre machen lassen, wenn das klinische Bild für Di. spricht. Auch wenn keine Di. Membran sichtbar ist, wenn das Bild eines Tonsillarabszesses oder einer Tonsillitis ulcerosa besteht, muß bei schwerem Allgemeinbefund an Di. gedacht werden. Bei den Erscheinungen der Kehlkopfstenose ist in erster Linie an Di. zu denken, auch wenn keinerlei Rachenbefund vorhanden ist. Die Seruminj. ist ungefährlich, selbst wenn früher bereits einmal Serum gegeben wurde. Pfaundler fand in der Literatur nur 3 Fälle von tödlicher Reaktion bei 110000 Reinj. mit einwöchentlichem Intervall. Das wichtigste Mittel im Kampfe gegen die manifeste Di. Erkrankung ist immer noch das Heilserum trotz aller Angriffe, die gerade auch heute wieder erhoben werden. Freilich ist seine Wirkung auch beschränkt. Ist der Körper einmal mit Toxin überschwemmt, ist das Gift bereits fest an die Zellen gebunden, dann haben auch die größten Dosen keinen Wert mehr, das Leben kann nicht mehr gerettet werden. Der Kampfzug bei manifester Di. Erkrankung lautet deshalb:

Seruminjektion so früh wie irgend möglich!

Zum Schlusse dieser Arbeit sei es mir erlaubt, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Jamin für die Überlassung des Themas sowie für die bereitwillige Unterstützung bei meiner Arbeit meinen besten Dank auszusprechen. Auch Herrn Prof. Dr. Kirch bin ich für die Überlassung der Sektionsprotokolle zu Danke verpflichtet.

Literatur.

- 1) *Acker*, Deutsches Archiv für klin. Med. Bd. 13.
- 2) *Baginský*, Diphtherie u. di. Krupp (Ipez. Path. u. Ther. v. Nothnagel).
- 3) *Behring*, Beiträge zur experim. Ther., Epid., Ätiol. d. Di. H. 13.
- 4) *Bokay*, Ergebnisse der inneren Med. u. Kdhlkd. Bd. 42 u. 43.
- 5) *Bormann*, Erg. der inneren Med. u. Kdhlkd. Bd. 45.
- 6) *Bormann*, Med. Klinik 1933, 2—3.
- 7) *Chura*, Jahrbuch für Kdrhlkd. 1931.
- 8) *De Rudder*, Klin. Wschr. 1923, 1.
- 9) *Friedemann*, Deutsche med. Wschr. 1920, S. 1134.
- 10) *Giertymühlen*, Zeitsh. f. Kdhlkd. 42 (1926).
- 11) *Hottinger*, Abhandl. aus d. Kdhlkd. u. ihren Grenzgeb. Heft 31.
- 12) *Hufler*, Münchn. med. Wschr. 1931, 30.
- 13) *Jamin*, Zeitsh. für ärztliche Fortbildung 1935, 15.
- 14) *Jochmann*, Lehrbuch der Infekt. Krankh.
- 15) *Kirch*, Zeitsh. für Kdhlkd. Bd. 33.
- 16) *Kirch*, Zeitsh. für Laryng. Bd. 20, Heft 2—3.
- 17) *Königsberger*, Archiv für Kdhlkd. Bd. 84. (1928).
- 18) *Königsberger*, Deutsche med. Wschr. 1931 S. 842.
- 19) *Lande*, Jahrbuch für Kdhlkd. 86 (1917).
- 20) *Langer*, Monatssh. für Kdhlkd. Bd. 48 (1930).
- 21) *Laufecker*, Münchn. med. Wschr. 1934, 6.
- 22) *Leede*, Zeitsh. für Kdhlkd. Bd. 8, S. 88.
- 23) *Lörfen*, Chirurgie Bd. 4.
- 24) *Moltchanoff*, Jahrbuch für Kdhlkd. Bd. 26 (1912).
- 25) *Munk*, Jahrbuch für Kdhlkd. 108 (1925).
- 26) *Oppenheimer*, Handbuch der Biochemie Bd. 6.
- 27) *Poloný*, Wiener med. Wchsh. 1935, 25.
- 28) *Reineck*, Münchn. med. Wschr. 1934, 16.
- 29) *Rietshel*, Münchn. med. Wschr. 1933, 49.
- 30) *Schick*, Handb. d. Kdhk. v. Pfaundler u. Schloßmann 1931 Bd. 2.
- 31) *Schoedel*, Jahrb. für Kdhlkd. 96 (1921).
- 32) *Siebert*, Ergebn. der inneren Med. u. Kdhlkd. Bd. 13 (1914).
- 33) *Siegert*, Ergebn. der inneren Med. u. Kdhlkd. Bd. 24.
- 34) *Spranger*, Veröff. aus dem Gebiet d. Med. Verwalt. Bd. 24, (1927).
- 35) *Stettner*, Deutsche Zeitschr. für Chirur. Bd. 229, Heft 3—5.
- 36) *Scirmay*, Jahrb. für Kdhlkd. 130 (1931).
- 37) *Szontagh*, Jahrbuch für Kdhlkd. Bd. 113.
- 38) *Žifchinský*, Abhandl. aus d. Kdhlkd. und ihren Grenzgeb. H. 36.

Lebenslauf.

Ich bin geboren am 25. Februar 1911 in Hauzenberg b. Passau als Sohn des jetzigen Zugführers Rupert Kufer und seiner Ehefrau Anna, geb. Moser. Von 1917—1921 besuchte ich die Volksschule in Nürnberg, von 1921—1930 das Humanistische Gymnasium zu Nürnberg. Hier legte ich auch 1930 die Reifeprüfung ab. Ich wandte mich dann dem Studium der Medizin zu. Meine vorklinischen Semester brachte ich an der Universität München zu, hier legte ich auch nach 5 Semestern die ärztliche Vorprüfung ab (1932). Von meinen klinischen Semestern verbrachte ich 2 in München (W. S. 1932/33 und S. S. 1934), die übrigen in Erlangen, wo ich im Herbst 1935 das ärztliche Staatsexamen bestand.
